兔熱癥

甚麼是兔熱癥？

- 兔熱癥是一種由*土拉倫氏桿菌*引起的感染，這種病菌可以感染動物和人類。美國每年經報告的人類兔熱癥病例約有200宗。美國的大多數兔熱癥是由於攜菌蝨子叮咬及接觸染病兔子所致。如果兔熱病菌被故意釋放，例如在生物恐怖主義事件中，則病菌最有可能被釋放到人們呼吸的空氣中。

兔熱癥如何傳播？有何癥狀？

- 與染病動物接觸、食用被污染的食物或水或吸入被污染的灰塵或飛沫，均會感染兔熱癥。兔熱癥不能在人類之間相互傳染。
- 視接觸方式而定，兔熱病有以下幾種發病形式：
  - *肺部感染（肺炎）* - 這是透過攜菌灰塵或浮質而吸入病菌後最常見的形式。
  - *頸部淋巴腺腫大及咽喉發炎* - 這是攝入攜菌食物或水之後最常見的形式。
  - *淋巴腺腫大，且伴有或不伴有皮膚潰瘍* - 在接觸攜菌物質或被攜菌蒼蠅或蝨子叮咬後會出現這種癥狀。
- 所有形式的兔熱病均伴有類似流感的癥狀，例如發燒、寒戰、頭痛、身體疼痛和虛弱，這些癥狀通常在與病菌接觸後三至五日內出現。兔熱癥患者可能出現胸部疼痛、呼吸困難及呼吸衰竭。

預防措施

- 如果出現癥狀，應儘快諮詢醫療機構。如果認為自己遭到故意的兔熱癥攻擊，請立即與執法人員聯絡。
- 如果曾與兔熱癥接觸過，可以使用抗生素療法來預防感染（預防療法）。兔熱癥目前沒有普遍使用的疫苗。

兔熱癥的治療

- 使用適當的抗生素及早治療至關重要。必須在醫生或當地醫療部門的指導下才能使用抗生素來預防或治療兔熱癥。

WASHINGTON MILITARY DEPARTMENT
Emergency Management Division
華盛頓州軍事部
緊急事務管理處
Camp Murray, WA 98430-5122
*網站：*www.emd.wa.gov
253-512-7000; (800) 562-6108

Washington State Department of Health
華盛頓州衛生部
PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890
*網站：*www.doh.wa.gov
360-236-4027; (800) 525-0127